

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

- ASMA BRÔNQUICA

TESTE Nº 2

Indique à frente de cada hipótese a que considera verdadeira/correcta (v) ou falsa/errada (f). Envie uma cópia das respostas para a Sede da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, ao cuidado do Editor do Curso.

PERGUNTAS

- 6 Não é um dos sintomas comuns do doente asmático? Escolha a afirmação correcta:
- a) Pieira. ()
 - b) Aperto torácico. ()
 - c) Hemoptises. ()
 - d) Dispneia. ()
 - e) Tosse. ()
7. Constitui sinal de mau prognóstico da crise de asma?
- a) Sudação e fadiga muscular. ()
 - b) Ausência dos ruidos pulmonares bilateralmente. ()
 - c) Hipotensão e pulso paradoxal. ()
 - d) Todas as anteriores. ()
 - e) Respostas 1) e 3). ()
- 8 Não é factor associado a um maior risco de crise de asma grave?
- a) História de asma na família. ()
 - b) Abandono recente de tratamento com corticoides. ()
 - c) Antecedentes de crises agudas de asma. ()
 - d) Não cumprimento da terapêutica anteriormente prescrita. ()
 - e) Hospitalização recente por asma. ()
9. É característico duma asma intermitente?
- a) Incapacidade de descanso nocturno superior a 4 horas. ()
 - b) Crises ocasionais de duração inferior a 40 horas. ()
 - c) PEF com valores <80% do prognosticado e variabilidade de 20-30%. ()
 - d) Intolerância ao esforço. ()
 - e) Absentismo escolar e laboral frequentes. ()
10. Na anamnese devemos caracterizar com exactidão:
- a) Factores desencadeantes nomeadamente pó, polen, fibras, etc. ()
 - b) Necessidade de recurso ao hospital e eventual internamentos. ()
 - c) Relação das crises com o esforço ou a toma de fármacos. ()
 - d) Frequência, horário, duração e intensidade das crises. ()
 - e) Todas. ()

NOME _____

MORADA _____

LOCAL DE TRABALHO _____

TELEFONE _____