...

I
I
I

)

TESTE DE AUTO-A V ALIA(:AO

- ·ASMA BRONQUICA
TESTE N° 5

lndigue a frentc de hip6tcse a que considcra verdadeira/correcta (v) ou CD. Envie uma c6pia
das rcspostas para a Sede da Socicdade Portuguesa de Pneumologia, (Apartado 1147- 1053 Lisboa Codex) ao cuidado do Editor do Curso.

PERGUNTAS
21. Na exacerbac;ao de asma br6nquica sao farmacos de I" linha:
a) Aminofilina + brometo de ipratr6pio. ( )
b) Aminofilina + corticoides. ( )
c) Aminofilina + corticoides + brometo de ipratr6pio. ( )
d) Beta 2 agonistas de curta durac;ao associados ou nao a corticoides. ( )
c) Brometo de ipratr6pio associado ou nao a corticoides. ( )
22. No scrvic;o de urgcncia perantc uma exaccrbac;ao de asma br6nquica::
a) A avaliac;ao da gravidadc deve ter em considerac;ao pelo mcnos os sintomas e sinais, e a determinac;ao do DEMI. ( )
b) A avaliac;ao da gravidadc deve tcr apenas em considerac;ao os sintomas c sinais. ( )
c) Nas formas graves a gasometria c dispensavel, devendo a avalias;ao da gravidade assentar na clinica e na dcterminas;ao do DEMI. ( )
d) Na avaliac;ao da gravidade e imprescindfvel o hcmograma e a radiografia de t6rax. (
e) Na avalic;ao das formas graves a gasometria e indispensavcl. ( )
23. No tratamento inicial da exacerbac;ao moderada dcve fazcr-se:
a) Beta 2 agonista + bromcto de ipratr6pio + 0 2 + corticoide sistemico. ( )
b) Beta 2 agonista + aminofilina + 02 + corticoide sistcmico. ( )
c) Beta 2 agonista + bromcto de ipratr6pio + 0 2 + corticoide inalado. ( )
d) 0 brometo de ipratr6pio deve scr associado aos beta 2 agonistas, pois a sua combinac;ao mostrou-se superior a qualquer deles isoladamente. ( )
e) Os coiticoides sistemicos nunca estao indicados ( )
24. Sao criterios de internamento em cuidado intcnsivos:
a) Exacerbayao modcrada com rcsposta imcompleta a terapeutica. (
b) Exacerbayao grave e ausencia de rcsposta a tcrapcutica. ( )
c) Altcrac;oes do estado de consciencia, como sonolcncia, confusao ou coma. (
d) Rcspirac;ao paradoxa!. ( )
c) Acidemia (pH<7,25) principalmente sc houvcr componente metab6lico associado. (
25. Sao criterios de internamento hospitalar:
a) Boa resposta a terapeutica. ( )
b) Persistencia do DEMI < 55% apcsar da terapeutica institufda. ( )
c) Hist6ria anterior de exacerbac;ao grave, particularmente com neccssidade de vcntilayao mecanica. ( ) d) Asmatico de alto risco. ( )
e) Persistencia do DEMI > 70%. (
NOME ____ _

MORAD A--·-----

LOCALDETRABALHO ____ __ _

TELEFONE __________________ _

Setembro/Outubro 1997 Vol. Ill W 5 535